
















Principio	Criterio	Medida	Puntuación	PUNTUACIÓN				
				100	80	55	20	0
Buena alimentación (0,15)	Ausencia de hambre prolongada (0,60)	Condición corporal (0,65)	CC1	<5%	<10%	<15%	<20%	≥20%
			CC2	<10%		≥10 a <20%		≥20%
		Edad al destete (0,35)	Días	>28	28	≥25 a <28	≥23 a <25	<23
	Ausencia de sed prolongada (0,40)	Suministro de agua (0,80)	Animales/ bebedero	≤10		11 o 12	>12	>15
			Cm / animal	≥26		<26 a ≥22	<22	<17
		Limpieza bebederos (0,20)	Estado	Limpio				Sucio
Buen alojamiento (0,25)	Confort durante el descanso (0,45)	Bursitis (0,35)	Moderada	≤5%		>5 a ≤15%		>15%
			Severa	≤2,5%	≤5%	≤10%	≤15%	>15%
		Lesiones en los hombros (0,30)	Moderadas	≤10%		>10 a ≤30%		>30%
			Severas	0%	≤5%	≤10%	≤15%	>15%
		Heces sobre el cuerpo madres (0,20)	Moderadas	≤5%		>5 a ≤15%		>15%
			Severas	≤2,5%	≤5%	≤10%	≤15%	>15%
	Heces sobre el cuerpo lechones (0,15)	Moderadas	≤10%		>10 a ≤30%		>30%	
		Severas	≤2,5%	≤5%	≤10%	≤15%	>15%	
	Confort térmico (0,30)	Jadeo madres (0,25)	Presencia	0%	≤10%	≤20%		>20%
		Jadeo lechones (0,25)	Presencia	0%	≤10%	≤20%		>20%
		Apiñamiento madres (0,25)	Apiñamiento 1	≤10%		>10 a ≤30%		>30%
			Apiñamiento 2	0%	≤5%	≤10%	≤15%	>15%
		Apiñamiento lechones (0,25)	Apiñamiento 1	≤10%		>10 a ≤30%		>30%
			Apiñamiento 2	0%	≤5%	≤10%	≤15%	>15%
Facilidad de movimiento (0,25)	Espacio disponible (0,60)	m ² /animal	>5	>4	>3	≥2,75	<2,75	
	Parideras (0,40)	Espacio	Correcto				Incorrecto	

Principio	Criterio	Medida	Puntuación	PUNTUACIÓN				
				 100	 80	 55	 20	 0
Buena Salud (0,35)	Ausencia lesiones (0,35)	Cojeras madres (0,20)	Cojera 1	≤5%		>5 a ≤15%		>15%
			Cojera 2	0	≤2,5%	≤5%	≤7,5%	>7,5%
		Cojeras lechones (0,20)	Cojera 1	≤10%		>10 a ≤30%		>30%
			Cojera 2	0%	≤10%	≤20%	≤30%	>30%
		Lesiones sobre el cuerpo (0,35)	Moderada	≤10%		>10 a ≤30%		>30%
			Severa	0%	≤10%	≤20%	≤30%	>30%
	Lesiones vulvares (0,25)	Moderada	≤5%		>5 a ≤15%		>15%	
		Severa	0	≤2,5%	≤5%	≤7,5%	>7,5%	
	Ausencia enfermedades (0,50)	Tos en lechones (0,025)	golpes/animal/5'	≤7		8-14	15-45	>45
		Estornudos en lechones (0,025)	golpe/animal/5'	≤13		13-26	27-54	>54
		Tos en madres (0,025)	Presencia	<10%	<20%	<30%	≤40%	>40%
		Estornudos en madres (0,025)	Presencia	<10%	<20%	<30%	≤40%	>40%
		Respiración dificultosa madres (0,025)	Presencia	0%		≤10%		>10%
		Respiración dificultosa lechones (0,025)	Puntuación 1	≤10%		>10 a ≤30%		>30%
			Puntuación 2	0%	≤10%	≤20%	≤30%	>30%
		Prolapso rectal madres (0,025)	Presencia	0%		≤10%		>10%
		Prolapso rectal lechones (0,025)	Puntuación 2	10%		20%		≥30%
		Diarrea en madres (0,05)	Presencia	0		1		2
		Diarrea en lechones (0,05)	Diarrea 1	≤10%		>10 a ≤30%		>30%
			Diarrea 2	0%	≤10%	≤20%	≤30%	>30%
Estreñimiento (0,05)		Presencia	0%	≤10%	≤20%		>20%	

Principio	Criterio	Medida	Puntuación	PUNTUACIÓN				
				 100	 80	 55	 20	 0
		Condición de la piel (0,1)	Moderada	≤10%		>10 a ≤30%		>30%
			Severa	0%	≤5%	≤10%	>30%	
		Hernias (0,05)	Moderada	≤10%		>10 a ≤30%		>20%
			Severa	0%	≤10%	≤20%	≤30%	>30%
		Mastitis (0,05)	Presencia	0%		≤10%	>10%	
		Metritis (0,05)	Presencia	0%	<10%	<20%	≤30%	>30%
		Prolapso uterino (0,05)	Presencia	0%		≤10%	≥10%	
		Infecciones locales (0,1)	Moderada	≤10%		>10 a ≤30%		>30%
			Severa	0%	≤10%	≤20%	≤30%	>30%
		Mortalidad lechones (0,1)	12 meses	<10%	<11%	<12%	≤13%	>13%
		Mortalidad madres (0,1)	12 meses	<5%	<6%	<10%	≤12%	>12%
		Trastornos neurológicos (0,025)	Puntuación 1	≤10%		>10 a ≤30%		>30%
			Puntuación 2	0%	≤10%	≤20%	≤30%	>30%
		Splay leg (0,025)	Puntuación 1	≤10%		>10 a ≤30%		>30%
	Puntuación 2		0%	≤10%	≤20%	≤30%	>30%	
	Ausencia de dolor inducido por el manejo (0,15)	Castración lechones (0,30)	Método, uso de analgesia y anestesia	0		1		2
		Corte de cola lechones (0,15)		0		1		2
		Anillado de hocico madres (0,20)		0		1		2
Corte de cola madres (0,15)		0			1		2	
Corte de dientes lechones (0,20)		0			1		2	

Principio	Criterio	Medida	Puntuación	PUNTUACIÓN				
				 100	 80	 55	 20	 0
Comportamiento apropiado (0,25)	C. Social (0,25)	Conductas sociales	Negativo/ negativo+positivo	<10%	<20%	≤30%		>30%
	Otras conductas (0,35)	Conducta exploratoria del corral (0,25)	S / activos	≥50%	≥40%	≥30%	≥20%	<20%
		Conducta exploratoria del material de enriquecimiento (0,25)	E / activos	≥25%	≥20%	≥15%	≥10%	<10%
		Estereotipias (0,50)	Presencia	<5%	<10%	<20%	≤30%	>30%
	Relación humano-animal (0,20)	Miedo a los humanos	Puntuación 1	<20%		20-30%		>30%
			Puntuación 2	<5%	≤10%	≤15%	>15%	
Estado emocional positivo (0,20)	Evaluación cualitativa de la conducta	Se introducen los datos en el simulador de cebo y se utiliza la puntuación final						